

G. TERAPIA GENITOURINARIA (INCL. HORMONAS SEXUALES)

G01A. ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS (excl. combinaciones con corticoides)

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| | CLINDAMICINA (GINE) | — | Se acepta el uso de clindamicina por vía vaginal durante el 2º trimestre. El uso en el primer trimestre sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. |
| | CLOTRIMAZOL (GINE) | — | En los tres primeros meses se evaluará el beneficio de la utilización. En las 4-6 últimas semanas, se recomienda prescindir del aplicador de los comprimidos vaginales. |
| | FENTICONAZOL (GINE) | — | Contraindicaciones: embarazadas. No se aconseja su uso durante el embarazo a menos que el beneficio justifique el posible riesgo para la paciente. |
| | FLUTRIMAZOL (GINE) | — | No se recomienda el uso durante el embarazo. |
| | KETOCONAZOL (GINE) | — | Contraindicaciones: embarazadas. Se aconseja evitar su uso en embarazadas salvo que el beneficio justifique el posible riesgo para la paciente. |
| | METRONIDAZOL (GINE) | — | El uso de este medicamento sólo se recomienda en ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. |

| | | | |
|--|------------------------|---|---|
| | MICONAZOL (GINE) | — | Se evaluará el riesgo beneficio en caso de usarse durante el primer trimestre de embarazo. |
| | SERTACONAZOL (GINE) | — | Utilizar sólo en ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. |
| | CICLOPIROX (GINE) | — | No se recomienda su uso salvo en aquellos casos en los que el beneficio supere al posible riesgo. |
| | NIFURATEL (GINE) | — | Contraindicaciones: embarazadas. |
| | POVIDONA IODADA (GINE) | — | Debe evitarse el uso continuado durante el embarazo. |

G02A. OXITÓCICOS

| | | | |
|--|----------------------------|---|---|
| | METILERGOMETRINA | C | El uso de este fármaco esta contraindicado durante el embarazo ya que su potente efecto uterotónico puede provocar abortos, desprendimiento de placenta, etc. Metilergometreina está indicada después del alumbramiento del niño. |
| | DINOPROSTONA | C | Cualquier dosis que produzca un incremento sustancial del tono uterino puede poner al embrión o feto en peligro. |
| | MISOPROSTOL (GINECOLOGICO) | X | Contraindicado. |

G02B. ANTICONCEPTIVOS LOCALES

| | | | |
|--|---------------------------|---|--|
| | LEVONORGESTREL (IMPLANTE) | — | Contraindicado en caso de embarazo o sospecha del mismo. |
|--|---------------------------|---|--|

G02C. OTROS GINECOLÓGICOS

G02CA. SIMPATICOMOMÉTICOS, INHIBIDORES DEL PARTO.

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| | RITODRINA | B | Uso aceptado a partir de la 20ª semana de gestación en embarazos no complicados. Uso contraindicado por el fabricante antes de la 20ª semana de gestación. |
|--|-----------|---|--|

G02CB. INHIBIDORES DE LA PROLACTINA.

El uso de bromocriptina o lisurida debe suspenderse inmediatamente si el embarazo ocurre durante la terapia y, en presencia de adenoma, la paciente debe ser cuidadosamente observada durante el embarazo, incluyendo chequeos regulares del campo visual. En embarazadas con tumores hipofisarios secretores de prolactina subyacentes, puede producirse una expansión repentina de los tumores por el incremento del tamaño de la pituitaria que normalmente ocurre durante el embarazo, pudiendo causar compresión del nervio óptico, daño visual e incluso ceguera, que usualmente desaparece después del parto; también puede ocurrir diabetes insípida y posible apoplejía de la pituitaria.

| | | | |
|--|--|---|---|
| | BROMOCRIPTINA (GINE) * (ORAL) | B | No se recomienda durante el embarazo, aconsejándose anticoncepción no hormonal en pacientes en tratamiento por hiperprolactinemia hasta que se establezcan los ciclos menstruales ovulatorios normales. |
| | Estudios recientes indican que no parece haber aumento de la incidencia de abortos espontáneos y efectos adversos en recién nacidos. Uso contraindicado en toxemia del embarazo. | | |

| | | | |
|--|---|----------|--|
| | CABERGOLINA (GINECOLOGIA) | B | Se recomienda que las mujeres que quieran quedar embarazadas conciban al menos un mes después de la interrupción del tratamiento. En caso de detectarse embarazo durante el tratamiento, éste deberá interrumpirse y deberán realizarse controles para detectar posible dilatación de la hipófisis debida a tumores preexistentes. |
| | Se recomienda que las mujeres que quieran quedar embarazadas conciban al menos un mes después de la interrupción del tratamiento. | | |
| | LISURIDA | — | No se recomienda durante el embarazo, aconsejándose anticoncepción no hormonal en pacientes en tratamiento por hiperprolactinemia hasta que se establezcan los ciclos menstruales ovulatorios normales. |
| | QUINAGOLIDA | — | El uso de este medicamento no se acepta durante el embarazo. |

G02CC. ANTIINFLAMATORIOS VAGINALES

| | | | |
|--|-------------------------------|---|---|
| | BENCIDAMINA (GINE) | — | Uso aceptable en base a estudios clínicos efectuados en mujeres embarazada., ya que la absorción sistémica es prácticamente nula. |
| | TETRIDAMINA | — | No hay información. |

G02CX. OTROS PRODUCTOS GINECOLÓGICOS

El uso de Atosibán está contraindicado en caso de rotura prematura de las membranas después de las 30 semanas de gestación, retraso del crecimiento intrauterino y frecuencia cardíaca fetal anormal, hemorragia uterina preparto que exija parto inmediato, eclampsia y preeclampsia grave que exija el parto, muerte intrauterina del feto, sospecha de infección intrauterina, placenta previa y abrupcio placenta.

| | | | |
|--|-----------------|---|--|
| | ATOSIBAN | — | Sólo se debe utilizar cuando se ha diagnosticado parto prematuro entre las 24 y las 33 semanas completas de gestación. |
|--|-----------------|---|--|

G03A. ANTICONCEPTIVOS HORMONALES SISTÉMICOS

No se requiere el uso de estos fármacos. No se ha observado ningún daño para la mujer, el curso de su embarazo o el feto si los ACO son usados accidentalmente durante el embarazo. Se debe descartar un embarazo antes de empezar la administración. Si la paciente queda embarazada durante el tratamiento, éste se debe interrumpir inmediatamente. No se ha observado que el empleo de anticonceptivos orales previamente al embarazo aumente el riesgo de aparición de defectos congénitos en niños nacidos de mujeres que los utilizaron ni tampoco de efectos teratogénicos al emplearse de forma inadvertida durante la primera fase del embarazo.

G

G03AC. PROGESTÁGENOS

| | | | |
|--|-----------------------|---|---|
| | DESOGESTREL | — | Contraindicación: Embarazo conocido o sospechado. |
| | ETONOGESTREL | — | Contraindicación: Embarazo conocido o sospechado. |
| | LEVONORGESTREL | X | Está contraindicado en caso de embarazo o sospecha del mismo. |

G03AD. ANTICONCEPTIVOS DE EMERGENCIA

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| | ULIPRISTAL | — | Contraindicado el uso durante el embarazo o si se sospechara de un embarazo. |
|--|-------------------|---|--|

G03B. ANDRÓGENOS

Los andrógenos causan virilización de los genitales externos del feto femenino (p.e. clitoromegalia, desarrollo vaginal anormal y fusión de las formas genitales para formar una estructura similar a la escrotal). El grado de masculinización esta relacionado con la cantidad de fármaco y la edad del feto y es más probable cuando se administran durante el primer trimestre.

G03BA. ANDRÓGENOS: DERIVADOS DE 3-OXOANDROSTENO

| | | | |
|--|------------------------|---|--|
| | TESTOSTERONA | X | Se recomienda a las pacientes en edad fértil que adopten medidas anticonceptivas eficaces durante todo el tratamiento. Las mujeres embarazadas deben evitar el contacto con las zonas de aplicación de este medicamento. |
| | TESTOSTERONA (DERMICA) | X | Las mujeres embarazadas deben evitar el contacto con las zonas de aplicación de este medicamento. |

G03BB. ANDÓGRÓGENOS: DERIVADOS DE 5-ANDROSTANONA

| | | | |
|--|-------------|---|-----------------|
| | MESTEROLONA | X | Contraindicado. |
|--|-------------|---|-----------------|

G03C. ESTRÓGENOS

Los estrógenos durante el embarazo tienen potencial teratogéno demostrado. Se ha descrito un síndrome conocido como VACTERL, nombre que agrupa las iniciales de los tipos de malformaciones a las que pueden dar lugar: vertebrales, anales, cardíacas, traqueales, esofágicas, radiales y renales. Este síndrome aparece con una frecuencia del 0.1% de los fetos expuestos. pueden causar efectos feminizantes de los fetos masculinos. se recomienda a las pacientes en edad fértil que adopten medidas anticonceptivas eficaces durante todo el tratamiento y, eventualmente, algún tiempo adicional después del mismo.

G03CA. ESTRÓGENOS NATURALES Y SEMISINTÉTICOS, SÓLOS

| | | | |
|--|-------------------------------|----------|--------------------|
| | ESTRADIOL (OESTRADIOL) | X | Contraindicado. |
| | ESTRIOL (OESTRIOL) | X | Contraindicado. |
| | ESTROGENOS CONJUGADOS | X | Contraindicado. |
| | PROMESTRIENO | — | No hay información |

G03D. PROGESTÁGENOS.

La mayoría de progestágenos pertenecen a la categoría X de la FDA. La utilización de progestágenos no ha mostrado ser eficaz en el tratamiento de la amenaza de aborto y aborto habitual, pudiendo además afectar al desarrollo del feto, especialmente si se administran en los primeros cuatro meses de embarazo. Por estas razones se desaconseja su uso, excepto en los casos en los que se haya comprobado la insuficiencia del cuerpo lúteo mediante biopsia de endometrio previa al embarazo, y por determinación de progesterona plasmática.

| | | | |
|--|--------------------------------------|----------|--|
| | GESTONORONA, CAPROATO | X | Contraindicado. |
| | HIDROXIPROGESTERONA, CAPROATO | X | Contraindicado. |
| | MEDROXIPROGESTERONA | X | Contraindicado. |
| | PROGESTERONA | — | En caso de deficiencia de progesterona, este medicamento puede utilizarse durante los primeros meses del embarazo. |
| | DIDROGESTERONA | X | Contraindicado. |
| | MEDROGESTONA | X | Contraindicado. |

| | | | |
|--|----------------------|---|---|
| | ALILESTRENOL | — | Se desaconseja su uso, excepto en los casos en los que se haya comprobado la insuficiencia del cuerpo lúteo mediante biopsia de endometrio previa al embarazo y por determinación de progesterona plasmática. |
| | LINESTRENOL | X | Contraindicado. |
| | NORETISTERONA | X | Contraindicado. |
| | TIBOLONA | — | Contraindicada durante el embarazo. |

G

G03G. GONADOTROFINAS Y OTROS ESTIMULANTES DE LA OVULACIÓN

Hasta el momento no se ha descrito ningún riesgo de teratogenicidad cuando se usaron clínicamente gonadotropinas para la hiperestimulación ovárica controlada. Los datos de exposición en mujeres embarazadas son insuficientes.

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| | CORIOGONADOTROPINA ALFA | — | No debe utilizarse, durante el embarazo. |
| | FOLITROPINA ALFA | X | Contraindicado. |
| | FOLITROPINA BETA | X | Contraindicado. |
| | GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA | C | Uso no recomendado en mujeres embarazadas. |
| | UROFOLITROPINA | — | Uso contraindicado durante el embarazo. |
| | CLOMIFENO | X | Contraindicado. |

G03H. ANTIANDRÓGENOS

| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| | CIPROTERONA | — | Uso contraindicado. Se aconseja anticoncepción e interrumpir el tratamiento si se sospecha o si existe embarazo. |
|--|--------------------|---|--|

G03X. OTRAS HORMONAS SEXUALES Y MODULADORES GENITALES.

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| | DANAZOL | X | Se recomienda a las pacientes en edad fértil que precisen de la administración de este medicamento, descartar previamente el embarazo y adoptar medidas anticonceptivas no hormonales eficaces durante todo el tratamiento. |
| | GESTRINONA | — | El uso de este medicamento está contraindicado en mujeres embarazadas. |
| | MIFEPRISTONA | X | Contraindicado. |
| | BAZEDOXIFENO | — | El empleo de bazedoxifeno durante el embarazo está contraindicado. También está contraindicada su utilización en mujeres en edad fértil, ya que no se ha evaluado su seguridad. |
| | RALOXIFENO | X | Contraindicado. |

G

GO4A. ANTISÉPTICOS Y ANTIINFECCIOSOS URINARIOS

| | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| | BREZO (ERICA CINEREA) | — | El uso del brezo sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. |
| | GAYUBA | — | El uso de la gayuba sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. |

G04B. OTROS PREPARADOS UROLÓGICOS.

G04BC. DISOLVENTES DE CÁLCULOS URINARIOS

| | | | |
|--|------------------------|----------|---|
| | POTASIO CITRATO | A | Usó generalmente aceptado en embarazadas. La subida o bajada de los niveles de potasio puede ser perjudicial para la función cardíaca de la madre y/o feto, por lo que los niveles deben ser monitorizados en caso de requerirse su utilización. Debe administrarse bajo estricto control médico. |
|--|------------------------|----------|---|

G04BD. ANTIESPASMÓDICO URINARIOS

El uso durante el embarazo de estos fármacos, sólo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras.

| | | | |
|--|---------------------|----------|---|
| | FESOTERODINA | C | No se recomienda utilizar fesoterodina durante el embarazo salvo en ausencia de alternativas más seguras y si los beneficios superan los riesgos. |
| | FLAVOXATO | B | Los estudios sobre animales no han registrado anomalías fetales. No hay estudios bien controlados en humanos. |
| | OXIBUTININA | B | Los estudios sobre animales no han registrado anomalías fetales. No hay estudios bien controlados en humanos. |

| | | | |
|--|--------------------------|----------|---|
| | SOLIFENACINA | — | Los estudios en animales no muestran efectos dañinos directos sobre la fertilidad, el desarrollo embrional/fetal ó el parto. Se desconoce el riesgo en humanos. |
| | TOLTERODINA | C | Si no hay alternativas más seguras. |
| | TROSPPIO, CLORURO | — | Los estudios en animales no han registrado efectos embriotóxicos y/o teratógenos. El cloruro de trospio atraviesa la placenta. No hay estudios en humanos. |

G

G04BX. OTROS PREPARADOS UROLÓGICOS

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|--|
| | ACETOHIDROXAMICO, ACIDO | X | Se recomienda a las pacientes en edad fértil que precisen de la administración de este medicamento, que adopten medidas anticonceptivas eficaces durante todo el tratamiento y, eventualmente, algún tiempo adicional después del mismo. |
|--|--------------------------------|----------|--|

G04C. FÁRMACOS USADOS EN LA HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA

G04CA. BLOQUEANTES ALFA-ADRENÉRGICOS

La terazosina presenta como indicación aprobada la hiperplasia benigna de próstata y la hipertensión arterial esencial leve o moderada.

| | | | |
|--|-------------------|----------|---|
| | TERAZOSINA | C | El uso de este medicamento sólo se acepta en ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. |
|--|-------------------|----------|---|

G04CB. INHIBIDORES DE LA TESTOSTERONA 5 ALFA-REDUCTASA

Basándose en los estudios en animales, es improbable que un feto masculino se vea afectado negativamente, si su madre se ve expuesta al semen de un paciente tratado con dutasterida (el riesgo es mayor durante las primeras 16 semanas de embarazo). Sin embargo, como ocurre con todos los inhibidores de la 5alfa reductasa, se recomienda que el paciente evite la exposición de su compañera al semen mediante la utilización de un preservativo cuando su compañera esté o pueda estar embarazada.

| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| | DUTASTERIDA | — | Contraindicado. El uso de este medicamento no está indicado en mujeres. |
| | FINASTERIDA | X | El uso de este medicamento no está indicado en mujeres. La finasterida puede causar anomalías de los genitales externos de fetos masculinos en mujeres embarazadas. Se desconoce la cantidad de finasterida que puede ser absorbida por una embarazada a través del semen de un paciente en tratamiento. Se han detectado pequeñas cantidades de finasterida en el semen de pacientes que han recibido 5mg/día de finasterida. Se desconoce si el feto varón puede verse afectado adversamente si su madre se expone al semen de un paciente tratado con finasterida. |

RESUMEN DEL GRUPO

USO ACEPTADO

POTASIO CITRATO

USO ACEPTABLE

BENCIDAMINA (GINE)

CLOTRIMAZOL (GINE)

SI NO HAY ALTERNATIVAS

BROMOCRIPTINA (GINE)

CABERGOLINA
(GINECOLOGIA)

CLINDAMICINA (GINE)

CLOTRIMAZOL

DINOPROSTONA

FESOTERODINA

FLAVOXATO

MICONAZOL (GINE)

KETOCONAZOL (GINE)

OXIBUTININA

RITODRINA

TERAZOSINA

TOLTERODINA

CON EXTREMADA CAUTELA

ATOSIBAN

BREZO (ERICA CINEREA)

CICLOPIROX (GINE)

GAYUBA

METRONIDAZOL (GINE)

POVIDONA IODADA (GINE)

SERTACONAZOL (GINE)

SOLIFENACINA

TROSPIO, CLORURO

CONTRAINDICADOS

ACETOHIDROXAMICO, ACIDO

ALILESTRENOL

BAZEDOXIFENO

CIPROTERONA

CLOMIFENO

CORIOGONADOTROPINA
ALFA

DANAZOL

DESOGESTREL

DIDROGESTERONA

DUTASTERIDA

ESTRADIOL (OESTRADIOL)

ESTRIOL (OESTRIOL)

ESTROGENOS CONJUGADOS

ETONOGESTREL

FENTICONAZOL (GINE)

FINASTERIDA

FLUTRIMAZOL (GINE)

FOLITROPINA ALFA

FOLITROPINA BETA

GESTONORONA, CAPROATO**GESTRINONA****GONADOTROFINA
CORIONICA HUMANA****HIDROXIPROGESTERONA,
CAPROATO****LEVONORGESTREL****LEVONORGESTREL
(IMPLANTE)****LINESTRENOL****LISURIDA****MEDROGESTONA****MEDROXIPROGESTERONA****MESTEROLONA****METILERGOMETRINA****MIFEPRISTONA****MISOPROSTOL
(GINECOLOGICO)****NIFURATEL (GINE)****NORETISTERONA****PROGESTERONA****QUINAGOLIDA****RALOXIFENO****TESTOSTERONA****TESTOSTERONA (DERMICA)****TIBOLONA****ULIPRISTAL****UROFOLITROPINA****SIN INFORMACIÓN****PROMESTRIENO****TETRIDAMINA****G**